

16
февраля



Информационный бюллетень отдела общественного здоровья
Гродненского областного ЦГЭОЗ

ЕДИННЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

День профилактики ИППП

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) - это инфекции, распространяющиеся в результате сексуальных контактов от человека человеку. Существует более 30 различных микроорганизмов, передающихся половым путем. Некоторые заболевания, в частности ВИЧ и сифилис, могут также передаваться от матери ребенку во время беременности и родов, а также через продукты крови и пересадку тканей.

К патогенным микроорганизмам, вызывающим некоторые из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем, относятся бактерии, вирусы и паразиты.

ИППП могут привести к появлению острых и развитию хронических инфекций, серьезных отдаленных по времени последствий.

Имеется ряд общих для всех ИППП **симптомов**: необычные выделения из половых органов, зуд, болезненность, частые позывы к мочеиспусканию, краснота, раздражение, язвочки в области половых органов, увеличение паховых лимфоузлов. Некоторые ИППП (например, гонококковая и хламидийная инфекции) часто протекают без симптомов

У женщин репродуктивного возраста ИППП могут стать причиной различных сексу-

альных расстройств, бесплодия, внематочной беременности, привести к выкидышам, преждевременным родам, врожденным патологиям плода и др.

У мужчин ИППП способствуют развитию бесплодия и сексуальных и сексуальных нарушений вплоть до импотенции.



Профилактические мероприятия

Эффективным способом профилактики передачи инфекции, передающейся половым путем, является ведение половой жизни только с неинфицированным партнером в рамках длительных взаимно моногамных отношений. Мужские латексные презервативы, при их постоянном и правильном использовании, высоко эффективны в сни-

жении передачи ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем, включая гонорею, хламидиоз и трихомоноз.

Профилактика ИППП во многом зависит от внутренних моральных установок человека (ориентация на более позднее начало половой жизни, отказ от добрых и внебрачных интим-

ных отношений, постоянный половой партнер, исключение случайных половых контактов, использование презерватива), что гарантирует безопасность интимной жизни и сохранение здоровья.

В случае подозрения на ИППП нужно незамедлительно обратиться в лечебное учреждение.

Обратите внимание:

По оценкам ВОЗ:

- ИППП относятся к числу наиболее распространенных заболеваний в мире;
- каждый день около 1 миллиона человек приобретают новые ИППП по всему миру;
- ежегодно во всем мире среди взрослого населения в возрасте 15-49 лет регистрируется 340 миллионов новых случаев излечимых ИППП (сифилиса, гонореи, хламидиоза и трихомоноза);
- в развивающихся странах ИППП и их осложнения входят в пятерку наиболее частых причин обращения взрослых людей за медицинской помощью.

К сведению:

В Гродненской области

- наблюдается тенденция к снижению заболеваемости населения ИППП:
- сифилисом – на 18,2 %,
 - гонореей – на 29,4 %,
 - трихомонозом – на 7,3 %,
 - хламидиозом – на 13,7 %.